

ПРОФИЛАКТИКА СТОЛЬНЯКА

Столбняк — острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, поражающее нервную систему с развитием болезненных спазмов мышц и судорог, до 40% случаев заканчиваются летальным исходом.



КАК ПЕРЕДАЕТСЯ?

Вызывается бактерией *Clostridium tetani*, находящейся в почве. Заболевание развивается при проникновении возбудителя через поврежденные кожные покровы и слизистые:

- ✓ с загрязненными землей или ржавыми предметами: царапины, ссадины, проколы, раны, опасны также мелкие травмы, получаемые при работе с землей на приусадебных участках;
- ✓ при ожогах и обморожениях;
- ✓ при укусах животных;
- ✓ во время родов вне медицинских учреждений.



СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Сначала появляется головная боль, потеря аппетита, беспокойство, повышение температуры тела. Затем пульсирующая тянущая боль в области травмы, спазм и судороги жевательных и мимических мышц, которые постепенно переходят на все тело, заставляя человека непроизвольно изгибаться дугой, сознание остается ясным. Особенно опасны нарушения глотания и дыхания, которые могут привести к смерти.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМУ?

Промыть рану водой с мылом, обработать перекисью водорода, края раны обработать спиртосодержащими антисептиками и незамедлительно обратиться в учреждение здравоохранения для получения квалифицированной медицинской помощи и решения вопроса о необходимости проведения вакцинопрофилактики против столбняка по эпидемическим показаниям. Тактику вакцинации определяет врач на основании прививочного анамнеза и характера раны.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – ПЛАНОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!



ДЕТЯМ в возрасте 2,3,4 и 18 месяцев, 6 и 16 лет.
ВЗРОСЛЫМ в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни.



СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК МОГУТ СПАСТИ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ