

ЧТО ТАКОЕ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВОМ ПУТЕМ?

ИППП – это заболевания, передающиеся преимущественно во время полового акта от одного инфицированного партнера другому

- В настоящее время известно более 30 ИППП. Наиболее часто встречающиеся из них – сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз, кандидоз, папилломовирусная инфекция (остроконечные кондиломы), генитальный герпес, гепатит В, СПИД и др.


- **ИППП оказывают глубокое воздействие на сексуальное и репродуктивное здоровье во всем мире.**
- **Ежедневно более одного миллиона человек приобретают ИППП. По оценкам ВОЗ, ежегодно 357 миллионов человек приобретают одну из четырех ИППП — хламидиоз (131 миллион), гонорею (78 миллионов), сифилис (5,6 миллиона) или трихомониаз (143 миллиона). Более 500 миллионов человек живут с инфекцией генитального ВПГ (герпеса). На любой момент времени более 290 миллионов женщин инфицированы ВПЧ, одной из наиболее распространенных ИППП.**

Как передаются ИППП?


заразиться можно:

- при сексуальном контакте (не только при половом, но и при оральном, анальном)
- при контакте с зараженной кровью (например, ВИЧ/СПИД, гепатит В и С)
- редко – бытовым путем.

Какая разница между венерическими болезнями и ИППП?



Какая разница между венерическими болезнями и ИППП?



В чем особенность инфекций, передающихся половым путем?

если они не лечатся или лечатся неправильно:

- переходят в хроническую, скрытую форму;
- вызывают необратимую утрату здоровья, как, например, бесплодие;
- во время беременности могут передаваться еще не родившемуся ребенку или младенец может заразиться во время родов.

Кто может заразиться ИППП?

- Заразиться ИППП может каждый активный в половом отношении человек.
- ИППП заражаются мужчины и женщины независимо от возраста, места жительства, этнической принадлежности и доходов.

Почему подростков называют группой риска заражения ИППП?

- часто рано начинают половую жизнь,
- меняют половых партнеров, вступают в сексуальные контакты с малознакомыми лицами, подвергая себя значительному риску инфицирования
- рано начинают употреблять алкоголь, наркотики и другие одурманивающие и веселящие вещества, что способствует легкой смене половых партнеров
- не знают многих вопросов профилактики ИППП, а иногда – не хотят знать
- не имеют достаточно денег, чтобы купить средства предохранения от нежелательных ИППП
- существует ряд физиологических особенностей юного поколения, способствующих большей вероятности заражения.

Женщины и мужчины...

Кто больше рискует?

- Анатомия женщины изначально повышает риск получения ИППП по сравнению с мужчиной.
- У женщин, менее вероятно, будут выраженные симптомы инфекций
- Женщины имеют больше шансов перепутать симптомы ИППП с чем-то еще.
- Женщины часто не могут видеть проявления заболевания так же легко как мужчины.
- ИППП могут привести к серьезным осложнениям и затронуть будущие репродуктивные планы женщины.
- Беременная женщина может передать ИППП младенцу.
- Вирус папилломы человека (ВПЧ) является довольно распространенной передающейся половым путем инфекцией у женщин, и может быть главной причиной рака шейки матки.

хорошие новости

- Женщины, как правило, обращаются к гинекологу чаще, чем мужчины к урологу.
- Существующая вакцина для профилактики ВПЧ и доступное лечение других ИППП могут предотвратить серьезные медицинские последствия
- На сегодняшний день существует много информационных ресурсов, доступных женщинам, чтобы узнать больше о мерах, которые они могут предпринять, чтобы защитить себя от ИППП

КАКИЕ СИМПТОМЫ СОПРОВОЖДАЮТ ИППП?

Как правило, к наиболее часто встречающимся симптомам у мужчин относятся:

- неприятные ощущения (дискомфорт) в мочеиспускательном канале;
- рези, жжение, боль при мочеиспускании;
- периодически возникающее учащенное мочеиспускание;
- появление выделений из мочеиспускательного канала (они могут быть как прозрачными, так и гнойными);
- язвочки, пузырьки или бородавки на половых органах, коже промежности или на других участках.
- увеличение лимфоузлов.

КАКИЕ СИМПТОМЫ СОПРОВОЖДАЮТ ИППП?

У женщин:

- могут появиться неприятные ощущения (жжение, рези, болезненность) при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание;
- изменяется характер выделений из влагалища и их количество (они могут приобретать неприятный запах);
- язвочки или другие высыпания в области наружных половых органов, промежности или на других участках кожных покровов;
- болезненность во время полового акта;
- боль в нижней части живота;
- увеличение лимфоузлов.

О чем следует помнить?

- после полового контакта может не появиться никаких симптомов
- большинство женщин и мужчин, заразившихся ИППП вообще не чувствуют никаких изменений из-за того, что их нет или они могут быть в таком месте, где их нельзя увидеть или почувствовать

Система оказания медицинской помощи больным с ИППП



Излечимы ли ИППП?

- Бактериальные инфекции – да
- Вирусные – смягчение течения, профилактика рецидивов

Проблемы, связанные с заболеваниями передаваемыми половым путем

ИППП являются причинами серьезных осложнений:

- ✓ восходящие воспалительные процессы, вызывающие внематочную беременность,
 - ✓ неблагоприятные исходы беременности,
 - ✓ бесплодие,
 - ✓ онкологические заболевания половых органов у женщин,
 - ✓ снижение потенции, вплоть до импотенции у мужчин.
- ✓ Наличие ИППП у человека многократно повышает риск заражения ВИЧ-инфекций.



**Самым тяжелым
заболеванием считается
сифилис – поражение
нервной системы,
внутренних органов,
негативное влияние на
генофонд и др.**



В течение 20 лет (1990-2010 гг.) в Республике Беларусь сифилисом переболели 147 328 человек.

Пик заболеваемости – 1996 г. (21616 новых случаев заболеваний сифилисом).

Несмотря на ежегодное снижение заболеваемости число новых случаев сифилиса остается высоким:

РБ	МИНСК	МИНСК	
в 2006 г. – 2635 (-17,1%),	315	2012	99
в 2007 г. – 2180 (-17%),	158	2013	148
в 2008 г. - 1841 (-15,6%),	177	2014	114
в 2009 г. – 1709 (-5,3%),	152	2015	105
в 2010 г. – 1136 (-33,3%)	132	2016	95
В 2011 г. – 1111	163	2017	88

Выводы:

- **заболеваемость сифилисом снижается,- относительное эпидемиологическое благополучие сохраняется**
- **Снижение заболеваемости сифилисом сопровождается изменениями в структуре клинических форм в сторону увеличения числа скрытых форм**
- **Несвоевременное выявление и лечение больных сифилисом может приводить к развитию тяжелых форм заболевания, приводящих в дальнейшем к инвалидизации пациента**
- **Не леченные ИППП могут иметь критические последствия для репродуктивного, материнского здоровья и для здоровья новорожденного. ИППП главная предотвращаемая причина бесплодия, особенно у женщин.**

**Информирование и консультирование
может улучшать способность людей
распознавать симптомы ИППП и
повышать вероятность того, что они
обратятся за медицинской помощью или
будут рекомендовать это своим
сексуальным партнерам.**