

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ко дню профилактики инфекций, передающихся половым путем

Инфекции, передающиеся половым путем (далее – ИППП), пагубно влияют на здоровье взрослых и детей во всем мире. При отсутствии лечения они чреватые серьезными хроническими последствиями для здоровья, включая бесплодие, внематочную беременность, неврологические и сердечно-сосудистые заболевания и повышенный риск инфицирования ВИЧ.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день более 1 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет заражается излечимыми инфекциями, передающимися половым путем.

На сегодняшний день мы много знаем о способах профилактики этих болезней, но показатели инфицирования ими остаются довольно высокими.

Цифры и факты:

✓ 30 видов бактерий, вирусов и паразитов передаются при половом контакте.

✓ 8 из них вызывают наиболее часто встречающиеся инфекции, передаваемые половым путем.

✓ 4 из этих 8 инфекций — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — сегодня поддаются лечению.

✓ 4 инфекции: гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ или герпес), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) — являются вирусными и неизлечимыми.

Инфекции, передаваемые половым путем, часто протекают бессимптомно. Однако, при отсутствии лечения, они могут вызывать серьезные последствия.

ИППП передаются преимущественно при половом контакте, включая вагинальный, анальный и оральный секс. Кроме того, некоторые ИППП передаются неполовым путем, например через кровь или препараты крови. Многие ИППП, включая хламидиоз, гонорею, первичную инфекцию, обусловленную вирусом гепатита В, ВИЧ и сифилис, могут также передаваться от матери плоду во время беременности и родов.

Симптомы ИППП могут включать в себя необычные выделения из половых органов, высыпания на области гениталий, болезненное или частое мочеиспускание, зуд и покраснение в области половых органов, волдыри или язвы во рту или вокруг него, аномальный вагинальный запах, анальный зуд, болезненность или кровотечение, боль в животе.

Единственным способом достоверно установить диагноз ИППП является тестирование. Если вы обеспокоены тем, что у вас или вашего сексуального партнера может быть ИППП, обратитесь к специалисту. Даже если у вас нет симптомов, возможно, у вас есть ИППП, требующее лечения для обеспечения сексуального здоровья вашего и ваших партнеров.

В городе Минске пройти обследование на ИППП и ВИЧ-инфекцию можно в следующих медицинских учреждениях (обследование по желанию пациента может быть анонимным):

- Учреждение здравоохранения «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Минск, ул. Прилукская, д. 46а;
- Амбулаторно-дерматовенерологическое отделение № 2 учреждения здравоохранения «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Минск, ул. Козлова, д. 7;
- Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу: г. Минск, ул. Клары Цеткин, д. 4, номер «горячей» телефонной линии по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа – 200-28-83);
- Поликлиника или женская консультация по месту жительства.

Коваленко Елена Владимировна

Главный врач учреждения здравоохранения «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Яромич Владимир Иванович

врач-дерматовенеролог (заведующий) амбулаторно-дерматовенерологического отделения № 4 учреждения здравоохранения «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»